
07 V4





Désignation: Chatus 1 Clos 10 Planche & Rang 5 3 Souche Vigueur : Date de Véraison: 7.8.63 Date de Maturité: 10,9,63 +4 Pourriture : 0 GRAPPE: G-M-P-L-M-6.15 BAIE : TG - G - ()- P. 15x15 Bl - Gr - Rs - Rg - (N.) Charge : s 10 saveur : O-m-ar-fox-herb. s 2 disc - Sph - ell. - Ov. Obev .- cyl - fus. 8 30 s 4 Lavec pépins - apyrène millerandi s 5 jus : inc. - coloré,

Désignation: Chatus 1 Clos M Planche & Rang S Souche 3 Vigueur : Date de Véraison: 4.8-64 Date de Maturité : 1.9.64 + 3 Pourriture: 0 (4 cm GRAPPE: G-W-P-L-M-C. Pédoncule : L - (1) - C. BAIE : TG - G - 1 - P. 14013 Bl. - Gr - Rs - Rg - N Charge : s 16 saveur: 6 - m - ary fox - herb. s 31 Obov. - cyl. - fus. s 46 s 5 2 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: (6) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5 Désignation: Chulin 1 Clos (O Planche & Rang 5 Souche } Vigueur: 5 Date de Véraison: 5.8.65 Date de Maturité V13.9.65 +4 Pourriture 0 14 GRAPPE : G -(N)- P - L - N -C) BAIE : TG - G -M - P B1. - GFX Rs - Rg - N) s 1 | saveur : (8)- m - ar - fox. herb. 8 2 4 disc (sph. - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. 836 s 4 5 avec pépins - apyréne s 5 % jus : inc. - colore

rédoncule : L-(M)

	! Monbre ! total !	!	DATUS .							
		1273	1.4	!		! î ! !	! ! !			
Y	!	!	!!!	1	1	1 1	!			
2	1 4	! 2 ×	13	i	<u>i</u> !					
3	1 3	12 x	2	!	!	!!!!	!!			
4	! 4	14	13 1	!!	!!!	! ! ! !	!			
5	! 5	! 1	!4 !	!	!	!!!				

D le 27.3 63 x

-9

26-3 1 1 2 3 4 3 4 3 4 4 5 2 5 6 5 4

D Q 26.364x (3)

Année 1965					
N Chal	us 1	. Planche	10.853	Côté	

	Nombre total		DATES							
		31,3	5,4							
1	4	1	3 ,							
2	6	2	3 *							
3	Ч	1	41							
4	5	0	3 ,							
5	4	2	3 ,							

\$ 3.4.65 × +6

Année: 1966
Emplacement .elso. P.8.53 ... Désignation ... chalus .t. ....

	Monbre	:						
	! total !	1163	121.3		!!	!!!!		
1	!4	121	1 Y 51	!	!	!	!	.!
2	6		12		1 0	66:	į	!
3	6		12		1/3		i	!
4	6	13+	144	0:21-	7	i		!
5	!5	11	1 00	Die	1+1	i	!	!

Designation: chatus 1

Clos Ac Planche 8 Côte S Rang 3 Souche 1 2 3 4 5

### (A) BOURGEOUNEAENT.

#### Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES MEUILLES DU FRAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 Slabres 4 seteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.
  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche () fauves ou rousses 1 carminues: à liser cormine () cuivress 4 jaunes 5 à plages bronzees (6) entièrement bronzees 7 vertes 8 autres9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine, la couleur de la 3° et de la 3° feuille détachées sort notée.

Désignation:

chatus 1

Clos 10 Planche 8 côté S rang 3 souche I 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3)

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9,
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement I partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

humes 5, 63

Désignation: chatus 1

Clos 10 Planche 8 Côté S3 Rang souche 2 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - nceuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair pala base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

## (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

Désignation chatus 1

Clos 10 Planche 8 Côté S rang 3 souche I 2 8 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
  velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- -- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 6
- Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 6. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38: Face inférieure : verte 🗗 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long I moyen @ court 3.
- 39 glabre 6 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

gausserand 7/63

Désignation

. chatus 1

Clos 10 Planche 8 Côté \$3 rang souche I 2 6 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne (2)- grande 3 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 0,7 duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux Wey duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan (1)- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté (4) tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement
  - 38: Face inférieure : verte (1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune I vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4/- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
  - supérieur à 90º 3. - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3. Calvo 6.64

Nº d'ordre

Chatry 1

Désignation

ASSAL M Planche

8 côté 5 Nº 3 souche 1 2 3 4 5

#### GRAPPE

24 - Crosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Campacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé!- mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne D Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.

28 - Forms: discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - tronccvoïde 4 - obcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale ; régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - nou déprimée (7)

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (-) épaisse 5.

53 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - nerbacécé - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A hourrelet de couleur verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident () - peu apparent 2.

32 A pinceau & court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Calvo 63

Dénomination	chatus 1
Planche	Côté . A souche 1-2-3-05 -
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3).  ! grêle fort (2). mount : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section trans	sversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  glabre (2), à épines ou analogues (3), à reils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotenneux (9).  entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) fusos
Mérithalle d	e longueur moyenne :
	gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), eu noeuds (4)
	: plus foncé ( de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(5).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétic	laire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

	diti
Nº d'ordre : 0129.13 Désignation	:. Maus .t
Origine :	
Emplacement 108-53 Van Vign.	
8 - Angle des nervures 1 - 2 - (	
9-L1/L	3)
10 - L <sub>2</sub> /L	1
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (	
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (1)	2)- 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 6	3) - 4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 6	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme 1 - 2 -	
17 - Dents : Méd/B	3.
18 - Angle lob. term	3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 -	
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 -	3-6-(7)-8-9,
21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>	3.
22 - Largeur S.P	3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur	
Direction : 1 - (2)-	9
Forme $:(4)-5.$	
Médiane/Base : 6-6-/	8) Domerque

## Formulaire de description 1/8

Observateur

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001

Code cépage : Oll9

Code clone: 12

Nom cépage : Chatris N

Emplacement: 2R7 s166-170

### Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9 oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 -

## Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

#### Vassal:

Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes	Fertilité (grappe/10 yeux)
2	16.3		4	(grapper to yeux)
2		16.3	9	
2	16.3	20.3	5	200
2/	13,3		2	SI
2/			1	3.0
10			1540-150	15
	bourgeons  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2	bourgeons début  2	bourgeons début moitié (oiv 301)  2	bourgeons début moitié (oiv 301) (oiv 153)  2

Date début	moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
2405	2465	23/05		17/07	30/67	6/08		(017 300)

mangel

#### Formulaire de description 2/8 (floraison)

Année: 2001

Code cépage :

Code introduction: 12 Nom introduction: Chatus N

Observateur

Emplacement 2 R7 s 166 - 170

#### Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 17

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente 1 - en liseré 2- partout 3

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7- très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte/1)- très forte 9 oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

#### Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 6 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 movenne 5 - forte 10 - très forte 9

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible D- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 1 très forte 9

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1)- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

#### Vassal:

#### Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées (/- en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204 Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 4 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte Couleur face sup. blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 -

plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213 (Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée : ....

#### Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan \( \mathbb{O}\) en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 283 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225. Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216. Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218-

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible ① - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233

### Formulaire de description 3/8

(floraison)

Année

2001

129 Code introduction: 12

Observateur TD

Code cépage : Nom introduction : Chattus W

Emplacement 2 R7s 166-170

#### Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9 oiv 351 vigueur rameaux : très faible B- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges D- rouge 3 oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte 10- verte à raies rouges 2 - rouge 3 oiv 009 couleur face dorsale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges D- rouge 3 oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte b- verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 9 - présence 9. oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence D- présence 9. oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 8 - forte 9

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1) - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles : discontinue (2 ou moins) V- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2 oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 5 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9

### Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud () au-delà du 4° noeud 2

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins (V-1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4 oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 présence 9

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (+1-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9

#### Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2.

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2, - monte 3.

000-21 Couleur des vrilles : jaune (1) – rouge clair (2) – rouge foncé 3 – vert 4

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3

Parfois Le las

## Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

2001 Année:

Code cépage :

Code introduction: 12

Observateur: TD

Nom introduction: Chatus N

Emplacement: 2 R7 \$166.170

#### Feuille adulte

oiv 065 taille : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 grande 7 - très grande 9

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois Deing 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle P - point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle P-point pétiolaire rouge 2

- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente © présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente? - présente 9.

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure

nulle ou très faible V- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5- forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 12- présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9.

#### Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible ? - faible ? - moyenne 5 - foite ? - très forte 9 oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible ? - faible 3 - moyenne 5 - foite 7 - très forte 9

oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9. [ sinus pétiolaire : ouverture = 1-2-3-4-5-6 / forme = U-accol. - V) dent = oui-non / dégarni non parfois-oui ]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

#### Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré 1

#### Formulaire de description 5/8 (maturité) Observateur TD Code cépage: 129 Code introduction :12 Nom introduction : Chaters N Emplacement 2R7166.170 Grappe oiv 202 longueur : très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 5 - moyenne (14-18 cm) 5 longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 13,5 oiv 203 largeur : très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 50 large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 14 oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte D très compacte 9 oiv 206 longueur pédoncule : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. 4 an oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7 oiv 208\* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3) oiv 209\* présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes 2) plus de trois ailes 3 Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3- moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) 12 oiv 221 largeur : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (~26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) 1 oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1)- uniforme 3 oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8 oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 bleu noir 6 oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9 oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9 oiv 229 ombilic : peu apparent - apparent 2 oiv 230\* coloration de la pulpe : non colorée ) - colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée V - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9 oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse/2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9 oiv 236 saveur : aucune 1) - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5 oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 5 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. 6 m oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3 oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 46 oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9 oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1) - présentes 2

## Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Observateur: TD

Année: 201 Code cépage: 129

Code introduction: 12

Emplacement: 2 R7 \$ 166 - 170

Nom introduction: Chatus N

#### Sarment

oiv 101 section transversale: circulaire 1 - elliptique 3 aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1- brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles: absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 10- présence 9. oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 10- présence 9.

oiv 351 vigueur : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) ()- courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. Valeur absolue: 76 oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) ()- petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9. Valeur absolue: 6

#### Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

#### Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment: absence 1 – partiellement présente 2 présente 3.

# Formulaire de description 6/8 (après clute des feuilles)

Année: Code cépage 123 Nom introduction

Code introduction 12

Observateur TD

Implacement 2 R 7 A. 166. 170

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire Delliptique 3 aplatie 5 oiv 102 surface : unie 1 côtelée 2 - strice 3

oiv 103 couleur générale : jaune D- brunâtre ? rouge violacé 3 gris 4

oiv 104 lenticelles absentes 19 présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds absence Ø présence 9 oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence Ø présence 9

oiv 351 vigueur : très faible 4 - faible 4 - movenne 5 - forte 7 - très forte 9 - oiv 352 croissance prompts-bourgeons : très faible 4 - movenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 353 longueur entrenoeuds : très courts (=60mm) ourts (90mm) 3 = movens (120mm) 5 longs (150mm) 7 = très longs (>180mm) 9. Valeur absolue 75 oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit (=5mm) 1 = petit (8mm) ouven (11mm) 5 grand (14mm) 7 = très grand (>17mm) 9. Valeur absolue 7

#### Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 faible 3 - moyen 5 élevé 7 très élevé 9 oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 élevé 7 très élevé 9, oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 très élevé 9.

Vassal:

Noeuds : aplatis 1 merens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment desence 1 partiellement présente 2 présente 3